

	PENCABUTAN GIGI ANAK DENGAN ANESTESI CHLOR ETHYL		
	SOP	No Dokumen : 021	
		No. Revisi : 1	
		Tanggal Terbit : 23 Januari 2023	
	Halaman : 1/3		
Puskesmas Tanjung			ZAINUDDIN, AMK NIP. 19660307199011003
1. Pengertian	Prosedur untuk pencabutan gigi anak / gigi decidui yang sudah goyah dengan menggunakan Chlor Ethyl.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melakukan pencabutan gigi sulung yang waktunya tanggal supaya gigi pengganti tumbuh dengan sempurna, atau atas indikasi-indikasi tertentu lain.		
3. Kebijakan	SK. Kepala Puskesmas No 016/SK-PKM/870Tahun 2023 Jenis-jenis Tindakan Pembedahan Minor.		
4. Referensi	Buku ajar praktis bedah mulut, Pederson, G. W.		
5. Prosedur	1. Alat : a. Alat standar (kaca mulut, ekskavator, sonde, pinset) b. Tang cabut anak 2. Bahan : a. Chlor ethyl b. Kapas steril c. Kassa sterild. Topical anestesi		
6. Langkah-langkah	Persiapan pasien : Persiapan pasien mulai dari saat ia tiba di poli gigi sama halnya dengan pasien dewasa yang akan dilakukan pencabutan gigi dewasa yaitu melalui tahap-tahap : - Anamnesa - Pemeriksaan - Menentukan diagnosis dan perawatan Jika telah ditentukan pasien memerlukan tindakan pencabutan gigi anak, maka selanjutnya : Menjelaskan kepada orang tua pasien bahwa akan dilakukan pencabutan pada gigi sulung yang sudah saatnya tanggal untuk memberi kesempatan gigi permanen tumbuh dengan baik. 1. Menjelaskan kepada anak / pasien bahwa sebelum pencabutan dilakukan pembiusan, yaitu pasien akan merasakan sensasi dingin 2. Menjelaskan kepada orang tua pasien bahwa akan dilakukan pencabutan pada gigi sulung yang sudah saatnya tanggal untuk memberi kesempatan gigi permanen tumbuh dengan baik. 3. Menjelaskan kepada anak / pasien bahwa sebelum pencabutan dilakukan pembiusan, yaitu pasien akan merasakan sensasi dingin Pelaksanaan : 1) Memakai sarung tangan 2) Mengambil kapas steril dua buah gulungan kemudian kapan dipegang dengan tangan kiri 3) Memegang tabung chlor ethyl dengan tangan kanan kemudian ujungnya didekatkan pada kapas dengan jarak 1 cm		

Pembesmas Tanjung	PENCABUTAN GIGI ANAK DENGAN ANESTESI CHLORETHYL SOP No. Indikasi: 001 No. Revisi: 1 Tanggal Terbit: 05 Januari 2022 Halaman: 2/3	ZAINUDDIN AMK NIP. 19650301198012000
	4) Semprotkan kapas dengan olitor etihyl, tunggu sampai kapas berbuih 5) Letakkan kapas sambil ditekan pada daerah bukal dan lingual / palatal mukosa gigi yang akan dicabut 6) Pada gigi yang mempunyai 1 akar, putar gigi searah sambil ditarik keluar 7) Pada gigi yang mempunyai lebih dari 1 akar, menggerakkan gigi ke arah bukal dan lingual / palatal supaya gigi terlepas dan menarik gigi keluar Instruksi pasca pencabutan 1. Cek apakah ada perdarahan atau tidak 2. Pasien diminta menggigit kapas kurang lebih selama 30 menit - 1 jam 3. Pasien diminta untuk tidak makan dan minum yang bersuhu panas terlebih dahulu	
7. Bagan Alir	<pre> graph TD A([Diagnosis]) --> B[Pasien memerlukan treatment pencabutan gigi yang goyah] B --> C[Inform consent orang tua] C --> D[Beri penjelasan pada anak mengenai tindakan pencabutan] D --> E[Mulai tindakan] E --> F[Ambil kapas 2 gulung steril, pegang dengan tangan kiri] F --> G[Semprot dengan CE, tunggu sampai kapas berbuih] G --> H[Letakkan kapas pada bukal & lingual / palatal mukosa gigi yang akan dicabut] H --> I[Cabut dengan tang, lakukan dengan cepat] I --> J[Kompresi soket dengan kassa] J --> K[Instruksi pasca pencabutan] K --> L[Peresepan pasien (jika diperlukan)] </pre>	
8. Hal-hal yang perlu diperhatikan		
9. Unit Terkait	1. Ruang keehatan gigi dan mulut	
10. Dokumen terkait	a. Buku Register b. Rekam Medik	